

Anesthesiologie

Pijnbestrijding

Perifere zenuwblokkade

Inleiding

De anesthesioloog/pijnspecialist heeft met u afgesproken dat uw pijnklachten behandeld worden met een blokkade van een perifere zenuw. De perifere zenuw ligt aan de buitenzijde van uw lichaam, ver weg van het centrale zenuwstelsel. Zo komen veel pijnklachten voor in een beperkt gebied van het lichaam. In veel gevallen kan het blokkeren van een bepaalde perifere zenuw deze pijnklachten verminderen of wegnemen.

Onderstaande informatie kan u helpen bij uw voorbereiding op de behandeling.

Let op De datum van de behandeling staat op de achterzijde van deze folder.

De behandeling

Een perifere zenuwblokkade kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

- Perifere zenuwblokkade met medicatie
- Perifere zenuwblokkade met stroomstootjes (PRF behandeling)

Perifere zenuwblokkade met medicatie

De huid rondom de zenuw wordt gedesinfecteerd. Soms is het nodig dat de anesthesioloog/pijnspecialist de huid zal verdoven met een lokaal verdovingsmiddel. Vervolgens plaatst de arts een speciale naald in het te behandelen gebied. Wanneer de naald goed zit, wordt de medicatie ingespoten. Soms gebruikt de arts een echo apparaat om de zenuw goed in beeld te krijgen.

- **Chirocaïne** (verdovingsmiddel) en **Depomedrol** (een ontstekingsremmer, corticosteroid).

Resultaat

Het langwerkende verdovingsmiddel chirocaïne zal tot enkele uren na de behandeling werken. Door de chirocaïne kan tijdelijk krachtsvermindering in het behandelde gebied optreden. De ontstekingsremmer heeft echter een aantal dagen tot weken nodig voordat deze optimaal resultaat geeft. Na deze behandeling kan het voorkomen dat u tijdelijk méér pijnklachten heeft; dit komt door irritatie van de zenuw

door het inspuiten van de ontstekingsremmer rondom de zenuw. De ontstekingsremmer zorgt er uiteindelijk voor uw pijnklachten gaan verminderen.

Ongeveer 6 weken na deze behandeling bespreekt u het resultaat van de behandeling met de arts. Een afspraak hiervoor is bijgevoegd of wordt naar u opgestuurd.

□ Perifere zenuwblokade PRF behandeling (Pulsed Radio Frequente behandeling)

De anesthesioloog/pijnspecialist zal het gebied rondom de zenuw desinfecteren, steriel afdekken en verdoven met een lokaal verdovingsmiddel. Vervolgens plaatst de arts via het verdoofde gebied een speciale naald ter hoogte van de zenuw, die behandeld moet worden. De naald wordt dan aangesloten op een apparaat dat radiofrequente stroom afgeeft. Om te bepalen of de naald goed zit, wordt er gestimuleerd met zwakke stroomstootjes. U geeft aan waar en wanneer u de stroomstootjes begint te voelen. Zo kan precies bepaald worden of de naald goed zit, of dat de naald eventueel wat verplaatst moeten worden. Als de naald op de juiste positie zit, zal deze kortdurend verhit worden.(42 graden Celcius)

Soms gebruikt de arts een echo apparaat om de zenuw goed in beeld te krijgen.

○ PRF behandeling

Resultaat

Door deze verhitting zal de pijngeleiding anders worden en kunnen uw klachten voor langere tijd verminderen. Dit zult u niet direct merken. Direct na deze behandeling kan het zelfs voorkomen dat u tijdelijk méér pijnklachten heeft; dit komt door de irritatie die kan optreden ten gevolge van de verhitting. Het kan 3 weken duren voordat u langzaam effect van de behandeling gaat merken.

De arts kan in overleg met U besluiten om tijdens de PRF behandeling Depomedrol (een ontstekingsremmer, corticosteroïd) te gebruiken.

Ongeveer 8 weken na deze behandeling bespreekt u het resultaat van de behandeling met de arts. Een afspraak hiervoor is bijgevoegd of wordt naar u opgestuurd.

Duur van de behandeling

Houdt u er rekening mee dat de totale duur dat u in het ziekenhuis bent ongeveer 30 minuten is.

Complicaties

- Na de behandeling kan meer pijn ontstaan. U kunt hiervoor u eigen pijnmedicatie innemen of paracetamol 1000 mg maximaal 4x daags. Deze pijn kan tot twee weken na de behandeling aanhouden.
- Na de behandeling kan een bloeditstorting (blauwe plek) ontstaan.
- Tijdelijk kan er krachtsvermindering aan de behandelde zijde optreden. Dit kan enkele uren duren.
- Hoewel zeldzaam, kan na de behandeling een nabloeding of koorts ontstaan. In dat geval moet u tijdens kantooruren pijnbehandelcentrum VieCuri bellen. Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Gang van zaken

Vorbereiding

- U dient een begeleider mee te brengen, omdat u in GEEN geval zelf aan het verkeer mag deelnemen. Heeft u geen begeleider mee, dan gaat de behandeling NIET door.
- Neem uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis.
- Als uw bloedverdünnende medicijnen veranderen en/of u krijgt ze voorgeschreven nadat u bij ons op het pijnbehandelcentrum bent geweest meldt dit zo snel mogelijk bij ons op het pijnbehandelcentrum. Het kan namelijk zijn dat deze bloedverdünnende medicijnen gestopt moeten worden voor de behandeling.
- U mag gewoon eten en drinken voor de behandeling.
- Draag ruim zittende en gemakkelijke kleding.
- Waardevolle spullen (sieraden en degelijke) thuis laten vanwege hygiënemaatregelen en om zoekraken te voorkomen.
- Neem een rolstoel bij de ingang van het ziekenhuis mee om na de behandeling erin te kunnen plaatsnemen. Denk hierbij aan een muntstuk van 2 euro dat u nodig hebt als borg.

Bloedverdünnende medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat deze voor de behandeling tijdelijk moet stoppen. De anesthesioloog/pijnspecialist heeft met u afgesproken:

- Plavix / Clopidogrel / Grepid
- Acetylsalicylzuur
- Carbasalaat Calcium
- Persantin / Dipyridamol
- Apixaban / Eliquis
- Xarelto
- Ticagrelor / Brilique
-
- dagen voor de behandeling stoppen van de aangekruiste medicijnen
- Doorgaan van de aangekruiste medicijnen

Na de behandeling kunt u weer doorgaan met de medicijnen, tenzij de anesthesioloog/pijnspecialist anders voorschrijft.

Trombosedienst

Gebruikt u de bloedverdünners

- Acenocoumarol (Sintrom)
- Marcoumar (Fenprocoumon)

Dan bent u onder behandeling van de trombosedienst. De pijnverpleegkundige van het pijnbehandelcentrum VieCuri geeft de datum van de behandeling door aan de trombosedienst. U krijgt tijdig bericht van de trombosedienst hoe u deze bloedverdünners moet gebruiken voor en na de behandeling.

Dag van de behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich:

Locatie Venlo

Volg routenummer 79.

U meldt zich bij de balie van de afdeling Radiologie. Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt hier opgehaald door een verpleegkundige/assistente.

Locatie Venray

Volg routenummer 31.

In de centrale hal ná de lift gaat u de eerste deur aan uw rechterkant binnen. U meldt zich bij de balie van het Poliklinisch Verrichtingen Centrum. U wordt hier opgehaald door een verpleegkundige/assistente.

Vóór de behandeling vermelden

Het is belangrijk vóór de behandeling te vermelden:

- Als u overgevoelig bent voor jodium, jodiumhoudende contrastvloeistof of pleisters;
- Als u diabetes heeft;
- Als u (mogelijk) zwanger bent;
- Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt;
- Als u een pacemaker of ICD heeft.

U wordt verwacht

.....dag.....

om.....uur

- Locatie Venlo**
Afdeling
Radiologie
routenummer 79

- Locatie Venray**
Poliklinisch Verrichtingen Centrum (PVC)
routenummer 31

Vragen

Heeft u vragen over de controledatum of wilt u uw controledatum wijzigen, neem dan contact op met het secretariaat van polikliniek Pijnbehandelcentrum.

Polikliniek Pijnbehandelcentrum VieCuri Medisch Centrum:
Locatie Venlo en Venray:

☎ 077 320 54 22

Heeft u vragen over de behandeling of complicaties na de behandeling neem dan contact op met de verpleegkundige tijdens het verpleegkundig spreekuur:

☎ 077 320 65 39

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl