

Cardiologie

Richtlijnen medicijngebruik

Voor en na een hartkatherisatie/ dotterbehandeling

U kunt 's morgens een normaal ontbijt nuttigen, 2 boterhammen en een kop koffie of thee. Uw medicijnen kunt u innemen met een klein slokje water, behalve:

- ❑ **Diuretica**
Gebruikt u plastabletten zoals Furosemide (Lasix), Bumetanide (Burinex), Hydrochloortiazide of een combinatiepreparaat met Hydrochloortiazide, Chloortalidon, Amiloride, Spironolacton, Eplerenon (Inspra): dan neemt u deze 's morgens **niet** in. Na het onderzoek kunt u deze medicijnen wel innemen.
- ❑ **Bloedverdunnende medicijnen**
 - Als u onder begeleiding staat van de Trombosedienst informeer deze dan over de ingreep. De Trombosedienst stemt dan het beleid met u af.
 - Gebruikt u Dabigatran, Xarelto, Eliquis, Rivaroxariban of Apixaban (NOAC), dan moet u daar 48 of 72 uur van tevoren mee stoppen. Dit hoort u tijdens het intakegesprek.
 - Andere bloedverdunnende medicijnen zoals Ascal, Acetylsalicylzuur, Carbasalaat, Plavix, Clopidogrel, Grepid, Brilique, Ticagrelor, Efiënt hoeft u niet te stoppen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de medicatie voor de hartkatheterisatie of FFR meting/ dotterbehandeling, dan kunt u contact opnemen met de intakeverpleegkundige.

Intake en planningscoördinator

☎ (077) 320 50 48

Tijdens de dagopname kunt u met vragen terecht bij de verpleegkundige op de verpleegafdeling.

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

internet: www.viecuri.nl