

## Chirurgie

# Peri-anaal abces

## De ingreep en adviezen voor thuis

### Inleiding

U heeft in overleg met uw arts besloten dat operatief een peri-anaal abces wordt ontlast. U heeft al informatie ontvangen. In deze folder kunt u alles rustig nalezen.

### Wat is een peri-anaal abces?

Een peri-anaal abces is een ontstoken slijmklief bij de anus. Deze verdikking bestaat uit een holte met pus. Het is vaak pijnlijk, warm en rood. Door de pijn kunt u niet meer rechtop zitten. Met een operatie kan de arts uw klachten wegnemen.

### Vorbereiding

Meestal wordt de operatie uitgevoerd vanuit het spoedprogramma. Dit betekent dat de ingreep plaatsvindt als er plaats is op de operatiekamer. Er is geen speciale voorbereiding nodig.

### Anesthesie

Afhankelijk van de grootte van het abces kiest de arts voor plaatselijke of algehele anesthesie (verdooving). Bij algehele anesthesie (=narcose) moet u nuchter zijn. Meer informatie vindt u in de folder "preoperatief onderzoek en anesthesie".

### De ingreep

De chirurg snijdt het abces open. Hij spoelt de holte schoon om de pus te verwijderen. De chirurg laat een drain of verbandgaas in de wond achter om de wond open te houden. Op deze manier kan alle pus de wond uit en ontstaat er niet opnieuw een abces.

### Na de ingreep

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapruijnte, waar gedurende de eerste uren bewaking en controle plaatsvinden. Soms treedt na de ingreep misselijkheid op. Na de ingreep heeft u een infuus in uw arm.

Als u voldoende hersteld bent gaat u terug naar uw eigen afdeling. Als alles naar wens verloopt mag u dezelfde dag weer naar huis.

## Adviezen voor thuis

### Wondverzorging

- Het is belangrijk de wond open te houden. Daarom moet u de wond twee tot drie keer per dag spoelen. U zet twee tot drie keer per dag de douchekop op de wond en spoelt de wond gedurende twee minuten schoon met water. Nadat u ontlasting heeft gehad moet u de wond ook spoelen met water.
- Na het spoelen dient u weer opnieuw een punt van een steriel gaas in de holte in te brengen, zodat de wond geleidelijk van onderaf kan dichtgroeien, wat overigens enkele weken kan duren..
- Zolang de wond open is, mag u niet zwemmen of in bad.

### Pijnstilling

Als pijnstilling kunt u indien nodig de eerste dagen (doorgaans 1 tot 4 dagen) paracetamol 1000 mg nemen, volgens behoefte 4 maal daags (te verkrijgen bij apotheek of drogist). Indien de pijn hiermee niet te bestrijden is verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek chirurgie.

### Drain

Indien er tijdens de operatie een drain achtergelaten is, wordt deze na een paar dagen verwijderd. Hier krijgt u een afspraak voor mee. Het verwijderen van de drain is overigens niet pijnlijk.

### Controle op de polikliniek

Als u geen drain heeft dan krijgt u een afspraak voor een poliklinische controle 1 tot 2 weken na de ingreep.

## Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

<b>Polikliniek Chirurgie</b>		
<b>Locatie Venlo</b>	routenummer 75	☎(077) 320 68 80
<b>Locatie Venray</b>	routenummer 12	☎(0478) 52 24 08

Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met:

### Spoedeisende Hulp (SEH) Locatie Venlo

☎(077) 320 58 10

## **VieCuri Medisch Centrum**

### **Locatie Venlo**

Tegelseweg 210  
5912 BL Venlo  
☎ (077) 320 55 55

### **Locatie Venray**

Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)

Bekijk uw medische gegevens op [www.mijnviecuri.nl](http://www.mijnviecuri.nl)