

Dermatologie

Allergologisch onderzoek

Door priktesten

Inleiding

U heeft in overleg met uw dermatoloog besloten om door priktesten* allergologisch onderzoek te laten doen.

Uw dermatoloog heeft u al uitleg gegeven. In deze folder kunt u alles rustig nalezen.

* *Niet alle priktesten zijn voor alle allergieklachten van toepassing.*

Welke priktest voor uw klachten geschikt is, bespreekt de dermatoloog met u.

Priktest met inhalatie en/of voedsel/kruiden allergenen

Bij deze test wordt een oplossing met daarin inhalatie allergenen, voedsel/kruiden allergenen met een pipet op de huid aangebracht. Vervolgens wordt er een krasje in gemaakt met behulp van een prik lancetje.

Vorbereiding op het onderzoek

- De dag van het onderzoek geen crèmes/bodylotion smeren op de rug;
- Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden ingenomen zoals acrivastine (Semprex), alimemazine (Nedeltran), cetirizine (Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchlorfeniramine (Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine (Kestine), fexofenadine (Telfast), hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine.

Het onderzoek

Bij het prikonderzoek ligt u op uw buik op een onderzoekstafel. De assistente maakt met een huidmarker 30 tot 60 puntjes op uw rug. Vervolgens legt ze naast de puntjes druppeltjes, waarin allergische stoffen zijn opgelost, zoals bijvoorbeeld huisstofmijt, graspollen, kattenharen of bepaalde voedingsbestanddelen. In elk druppeltje wordt een krasje gezet. Bij een allergische reactie ontstaat een bultje op de plaats van de priktest.

De test wordt na 20 minuten afgelezen.

De dermatoloog zal u uitleggen voor welke stof u allergisch bent. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

□ Prik-prik test

Bij dit onderzoek wordt getest met vers fruit, verse groenten of soms met planten of bloemen.

Vorbereiding op het onderzoek

- De dag van het onderzoek geen crèmes /bodylotion smeren op de rug
- Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden ingenomen zoals acrivastine (Semprex), alimemazine (Nedeltran), cetirizine (Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchlorfeniramine (Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine (Kestine), fexofenadine (Telfast), hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine.
- ***U dient zelf de te testen stoffen mee te brengen.***

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op de onderzoekstafel. Het onderzoek wordt meestal op de huid van de rug gedaan.

Met een prikclancetje wordt in bijvoorbeeld een appel geprikt en dan met hetzelfde prikclancetje in de huid van de rug geprikt. Daarnaast worden er 2 controles, met controle vloeistof en histamine oplossing, op de huid aangebracht. Hier wordt een krasje in gegeven.

De test wordt na 20 minuten afgelezen.

De dermatoloog zal u uitleggen voor welke stof u allergisch bent. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

□ Priktest met verdunde stof (verdunningsreeks)

Bij een priktest met een verdunningsreeks wordt onderzocht of u allergisch bent voor een bepaald voedingsmiddel of geneesmiddel zoals een verdovingsmiddel.

Vorbereiding op het onderzoek

- Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden ingenomen zoals acrivastine (Semprex), alimemazine (Nedeltran), cetirizine (Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchlorfeniramine (Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine (Kestine), fexofenadine (Telfast), hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zal het betreffende voedingsmiddel of geneesmiddel in verschillende concentraties verdund worden. Gestart wordt met sterk verdunde concentratie. 1:1000. Daarna volgt een verdunde concentratie van 1:100, 1:10, 1:1. Op uw onderarm wordt een druppel van deze stof gelegd en vervolgens wordt er een krasje in gemaakt met behulp van een prikclancet. Eerst worden er van 2 controle vloeistoffen druppels op uw arm gelegd en er een krasje in gemaakt met behulp van een prikclancetje.

Tijdens het onderzoek moet u op de kamer blijven zitten

Na 20 minuten wordt de reactie afgelezen en wordt een druppel van de volgende concentratie aangebracht. Deze wordt dan na 10 minuten afgelezen.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

De dermatoloog bespreekt de uitslag van de test met u.

Intradermale test

Bij dit onderzoek wordt een kleine kwaddel gespoten net onder huid. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een verdunning van het te testen geneesmiddel.

Vorbereiding op het onderzoek

- Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden ingenomen zoals acrivastine (Semprex), alimemazine (Nedeltran), cetirizine (Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchlorfeniramine (Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine (Kestine), fexofenadine (Telfast), hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine.

De reactie wordt na 20 minuten afgelezen.

De dermatoloog bespreekt de uitslag van de test met u.

Provocatie test

Bij deze test wordt een stof onverdund onder toezicht van verpleegkundige en dermatoloog toegediend. Deze test wordt niet vaak gedaan. Eerst wordt een stof met een verdunningsreeks getest.

Vorbereiding op het onderzoek

- Vanaf 5 dagen voor de test mogen geen medicijnen voor de jeuk meer worden ingenomen zoals: acrivastine (Semprex), alimemazine (Nedeltran), cetirizine (Zyrtec), clemastine (Tavegil), desloratadine (Aerius), dexchlorfeniramine (Polaramine), dimentindeen (Fenistil), ebastine (Kestine), fexofenadine (Telfast), hydroxyzine (Atarax), ketofin (Zaditen), levocitirizine (Xyzal), loratadine (Allerfree), mizolastine (Mizollen), oxatomide (Tinset), promethazine.

De reactie wordt meestal na 20 minuten afgelezen, afhankelijk van de toedieningsweg.

De dermatoloog bespreekt met u de uitslag.

U wordt verwacht

Test

.....dag, omuur

Locatie Venlo, route 9 **Locatie Venray, route 74**

- priktest met inhalatie en/of voedsel/kruiden allergenen
- prik-prik test
- priktest door middel van verdunningsreeks
- provocatie test
- intradermale test

Uitslag

.....dag, omuur

Locatie Venlo,route 9 **Locatie Venray, route 74**

- Mw. Dr. K. Gostynska
- Dr. J.P.A. van Pelt
- Mw. Dr. M.J.M. de Rooij
- Mw. Dr. K. Klaassen

- Mw. Dr. M. van Geel-Kucharekova
- Mw. K.M. van Poppelen
- Mw Dr. S.T.H.P Verleisdonk-Bolhaar

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Dermatologie		
Locatie Venlo	routennummer 9	☎(077) 320 68 48
Locatie Venray	routennummer 71	☎(0478) 52 24 26

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎(077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

internet: www.viecuri.nl