

Maag Darm Leverziekten (MDL)

Gastroscoopie Pools

Gastroskopia / Badanie endoskopowe żołądka

Wstęp

Jesteś umówiony na spotkanie na gastroskopię (badanie endoskopowe żołądka). Twój lekarz już cię poinformował, jak to badanie przebiega. Tutaj możesz jeszcze wszystko na spokojnie przeczytać.

Czym jest gastroskopia?

Gastroskopia to badanie wnętrza przełyku, żołądka i dwunastnicy. Badanie wykonuje się za pomocą gastroskopu. Jest to giętka rurka. Gastroskop jest ostrożnie wprowadzany przez usta, ponad językiem do przełyku, żołądka i dwunastnicy. Dokładnie jest badana przy tym błona śluzowa.

Przygotowanie

Na czczo

By poddać się badaniu musisz być na czczo. Oznacza to, że od północy nie możesz już jeść, pić ani palić.

Jeśli badanie odbywa się po południu, do godz. 08:00 rano można spożyć jeszcze lekkie śniadanie, takie jak filiżanka herbaty z sucharem. Po godz. 8:00 trzeba być na czczo.

Leki przeciwzakrzepowe

Nie jest konieczne odstawienie leków przeciwzakrzepowych, chyba że uzgodniono inaczej.

W przypadku stosowania antagonistów witaminy K (na przykład acenokumarolu, fenpropakumonu, Marcoumaru) należy pobrać próbkę krwi w dniu badania w celu określenia wartości INR (czasu krzepnięcia krwi).

Cukrzyca

Jeśli bierzesz leki na cukrzycę (tabletki lub zastrzyki), skontaktuj się z pielęgniarką diabetologiczną. Przeanalizuje ona z tobą, jak powinieneś przyjmować leki.

Jeśli bierzesz tabletki, nie należy przyjmować tabletek w dniu badania aż do zakończenia badania. Tabletki można ponownie przyjąć po badaniu. leki.

Rozrusznik serca lub ICD

Jeżeli masz rozrusznik serca lub ICD (wszczepialny kardiowerter-defibrylator), to będziesz miał spotkanie z technikiem rozrusznika serca, który ustawi rozrusznik serca lub ICD, aby badanie mogło odbyć się bezpiecznie.

Badanie

W dniu badania zgłaszasz się o uzgodnionej godzinie na oddział, gdzie odbędzie się badanie. Zwróć szczególną uwagę na to, czy musisz zgłosić się na oddział w Venlo czy Venray.

Badanie odbywa się w pracowni endoskopowej.

Tuż przed badaniem

Zanim badanie zostanie przeprowadzone, trzeba jeszcze wykonać kilka rzeczy.

- Jeśli nosisz protezę dentystyczną, prosimy o wyjęcie jej z ust przed badaniem.
- Jeśli masz piercing języka, musisz go zdjąć przed badaniem.
- Być może otrzymasz napój, aby zapobiec tworzeniu się piany w żołądku.
- Przed badaniem gardło zostaje miejscowo znieczulone sprayem.

Lekarz zada ci jeszcze kilka pytań kontrolnych, po których można będzie rozpocząć badanie.

Badanie

Kładziesz się na lewym boku na stole badawczym. Do ust zostanie ci włożony pierścień zapobiegający ugryzieniu, celem ochrony twojego uzębienia i gastrokopu. Lekarz wprowadzi ci przez usta gastrokop do przełyku, żołądka i dwunastnicy. Z chwilą wejścia gastrokopu do środka może pojawić się odruch wymiotny.

Wprowadzenie gastrokopu trwa bardzo krótko.

Podczas badania możesz normalnie oddychać.

Gaz CO₂

Podczas badania jest wprowadzany przez gastrokop gaz CO₂, aby przełyk, żołądek i niewielka część jelita cienkiego były lepiej widoczne. Mogą pojawić się wzdęcia i odbijanie.

Badanie mikroskopowe

Jeśli lekarz uzna to za konieczne, może pobrać wycinki błony śluzowej żołądka, przełyku lub jelita cienkiego w celu badania mikroskopowego. To nie jest bolesne.

Czas trwania badania

Całe badanie trwa od 10 do 15 minut.

Po badaniu

Jeśli gardło zostało miejscowo znieczulone sprayem, nie wolno ci jeść ani pić przez pół godziny po badaniu. Ma to na celu zapobieganie zadławieniu się. W innych przypadkach możesz ponownie jeść i pić po badaniu.

Po badaniu możesz rozpocząć przyjmowanie przepisanych leków, chyba że uzgodniono inaczej.

Wynik

Wyniki badania otrzymasz od lekarza (pierwszego kontaktu), który skierował cię na badanie.

Komplikacje

Gastroskopia jest bezpiecznym badaniem. Pomimo należytej staranności w rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania.

Krwawienie

W większości przypadków jest to krwawienie po badaniu. Zdarza się to przede wszystkim u ludzi, którzy przyjmują środki przeciwzakrzepowe lub środki przeciwbólowe.

Perforacja

Poważnym powikłaniem jest otwór w ścianie przełyku, żołądka lub dwunastnicy.

Zakrztuszenie się

Innym rzadkim powikłaniem jest zakażenie dróg oddechowych lub zapalenie płuc. Może do tego dojść, jeśli zakrztusisz się i zawartość żołądka trafi do twoich dróg oddechowych.

Co robić w przypadku problemów w domu?

(Venlo i Venray)

Skontaktuj się z Centrum Endoskopii, jeśli jest mowa o:

- Utracie krwi
- Bardzo czarnych stolcach
- Trwałym lub nasilającym się bólu brzucha
- Gorączce
- Dusznościach

W godzinach pracy biura • (077) 320 51 32

Poza godzinami pracy biura • (077) 320 58 10 (Oddział Ratunkowy)

Wizyta wyznaczona została na

.....dzień.....

○godzinie

- Oddział Venlo**
Centrum endoskopii numer trasy 83
- Oddział Venray**
Oddział endoskopii numer trasy 23

Idąc do szpitala weź ze sobą kartę szpitalną oraz ważny dokument tożsamości.

Pytania

Jeśli po przeczytaniu tej broszury masz jakieś pytania, zapytaj pielęgniarkę endoskopową przed rozpoczęciem badania. W przypadku pilnych pytań możesz również skontaktować się z:

Badanie endoskopowe

Oddział Venlo Centrum endoskopii

☎ (077) 320 51 32

Oddział Venray Pracownia endoskopii

☎ (0478) 52 22 22
znak 793-411

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl