

Maag Darm Leverziekten (MDL)

Gastroscoopie

Endoscopisch onderzoek van de maag

Inleiding

U heeft een afspraak voor een gastroscoopie (endoscopisch maagonderzoek). Uw arts heeft u al verteld hoe dit onderzoek in zijn werk gaat. Hier kunt u alles rustig nalezen.

Wat is een gastroscoopie

Een gastroscoopie is een onderzoek van de binnenkant van uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Het onderzoek wordt verricht met een gastroscoop. Dit is een stuurbare, buigzame slang. De gastroscoop wordt via de mond, over de tong voorzichtig in de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm gebracht. Het slijmvlies wordt hierbij goed bekeken.

Vorbereiding

Nuchter

Voor dit onderzoek moet u **nuchter** zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niet meer mag eten, drinken of roken.

Als het onderzoek 's middags plaatsvindt mag u vóór 08.00 uur 's morgens nog een licht ontbijt gebruiken zoals een kop thee met een beschuit. Ná 8.00 uur moet u nuchter blijven.

Bloedverdunnende medicijnen

Het is niet nodig om bloedverdunnende medicijnen te stoppen, tenzij anders met u wordt afgesproken.

Wel moet bij gebruik van vitamine K-antagonisten (bijvoorbeeld acenocoumarol, fenprocoumon, marcoumar) op de dag van het onderzoek een bloedafname plaatsvinden om de INR (stollingstijd van het bloed) te bepalen. Hierover krijgt u bericht van de trombosedienst.

Diabetes

Als u voor uw diabetes insulinespuiten gebruikt, neem dan contact op met uw diabetesverpleegkundige. Hij/zij stemt dan met u af hoe u de medicijnen moet gebruiken.

Bij gebruik van tabletten mag u de dag van het onderzoek geen tabletten innemen tot na het onderzoek. Na het onderzoek mag u de tabletten weer innemen.

Pacemaker of ICD

Heeft u een pacemaker of ICD (een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator)? Dan zorgen de verpleegkundigen van de endoscopieafdeling ervoor dat uw pacemaker/ICD indien nodig door de pacemakertechnicus wordt aangepast/ingesteld zodat het onderzoek veilig kan plaatsvinden.

Meenemen naar het ziekenhuis

Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis meenemen:

- Uw ziekenhuispas en een geldig identiteitsbewijs
- Uw actuele medicijnoverzicht (AMO); dit kunt u opvragen bij uw apotheek.

Het onderzoek

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar het onderzoek plaatsvindt. Let goed op of u op locatie Venlo of locatie Venray moet zijn.

Het onderzoek vindt plaats op de endoscopiekamer.

Vlak voor het onderzoek

Voordat het onderzoek start moeten nog enkele zaken gebeuren.

- Wanneer u een gebitsprothese draagt, vragen wij u deze voor het onderzoek uit uw mond te nemen.
- Als u een tongpiercing heeft dient u deze voor het onderzoek te verwijderen.
- Het kan zijn dat u een drankje krijgt om de schuimvorming in de maag tegen te gaan.
- Voor het onderzoek wordt uw keel plaatselijk verdoofd met een spray.

De arts zal nog een aantal controlevragen stellen waarna het onderzoek kan starten.

Het onderzoek

U gaat op uw linkerzij op de onderzoektafel liggen. U krijgt een bijtring in de mond om uw tanden en de gastroscoop te beschermen.

De arts brengt via uw mond de gastroscoop naar de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Op het moment dat de gastroscoop naar binnengaat, kan een kokhalsneiging ontstaan. Het inbrengen van de gastroscoop duurt heel kort. Gedurende het onderzoek kunt u normaal ademhalen.

CO₂-gas

Tijdens het onderzoek wordt er via de gastroscoop CO₂-gas ingeblazen om slokdarm, maag en een klein gedeelte van de dunne darm beter zichtbaar te maken. Het kan zijn dat u daardoor een vol gevoel krijgt en moet boeren.

Microscopisch onderzoek

Wanneer de arts het nodig vindt kan hij kleine stukjes slijmvlies van de maag, slokdarm of dunne darm wegnemen voor microscopisch onderzoek. Dit is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Als uw keel plaatselijk is verdoofd met een spray, mag u gedurende een half uur na het onderzoek niet eten en drinken. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt. In andere gevallen mag u na het onderzoek weer gewoon eten en drinken.

Na het onderzoek kunt u de u voorgeschreven medicijnen weer starten, tenzij anders met u is afgesproken.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw aanvragend (huis)arts.

Complicaties

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen in zeldzame gevallen complicaties optreden.

Bloeding

In de meeste gevallen gaat het om een nabloeding. Dit komt vooral voor bij mensen die bloedverdunners of pijnstillers gebruiken.

Perforatie

Een ernstige complicatie is een gaatje in de wand van de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm.

Aspiratie

Een andere zeldzame complicatie is een luchtweginfectie of longontsteking. Dit kan ontstaan als u zich verslikt en er maaginhoud in uw luchtwegen terecht komt.

Wat te doen bij problemen thuis? (Venlo en Venray)

Neem contact op met het Endoscopiecentrum als er sprake is van:

- Bloedverlies
- Pikzwarte ontlasting
- Blijvende of steeds erger wordende buikpijn
- Koorts
- Benauwdheidsklachten

Tijdens kantooruren ☎ (077) 320 51 32

Buiten kantooruren ☎ (077) 320 58 10 (Spoedeisende Hulp)

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, stel deze dan gerust aan de endoscopieverpleegkundige voordat het onderzoek begint. Voor eventueel dringende vragen kunt u ook contact opnemen met:

Locatie Venlo	Endoscopiecentrum	☎ (077) 320 51 32
----------------------	-------------------	-------------------

Neem altijd uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs mee.

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl