

Geboortecentrum / Verloskunde

Remifentanyl pools

Karta informacyjna Remifentanyl

Remifentanil (pompka morfiny) podczas porodu - Co powinnaś wiedzieć

Jak działa remifentanyl?

Remifentanil jest silnym lekiem przeciwbólowym o krótkim działaniu 3-5 minut. Po jego wstrzymaniu, lek szybko znika z organizmu. Remifentanyl jest podawany przez kroplówkę z zastosowaniem pompki. Masz możliwość samodzielnego dozowania uśmierzania bólu, naciskając przycisk. Po naciśnięciu przycisku lek jest uwalniany przez kroplówkę do organizmu. Pompka została tak ustawiona, że nie można przedawkować. Po zastosowaniu maksymalnej dawki pompka przestanie podawać Remifentanil. W momencie, gdy zaczniesz przeć, podawanie remifentanylu zostanie wstrzymane.

Korzyści Remifentanylu

- krótko i silnie działający lek przeciwbólowy, który równie szybko znika z organizmu
- działa szybko po podaniu
- może być stosowany przez cały okres rozwierania się szyjki macicy.
- samokontrola: naciskając na przycisk możesz złagodzić ból

Wady remifentanylu?

Remifentanyl jest stosowany od lat podczas operacji. W Niderlandach remifentanyl jest również stosowany od 2005 r. podczas porodu. Do tego zastosowania nie jest oficjalnie zarejestrowany. Nie wiadomo, czy ma długoterminowe konsekwencje dla dziecka.

- wymagany jest sprzęt monitorujący: kroplówka, pomiar tlenu, pomiar ciśnienia krwi, wideo serca dziecka. Co wymaga trochę czasu na przygotowanie.
- skuteczność zmniejsza się po 4 do 6 godzinach stosowania
- Remifentanyl ma działania uboczne, takie jak nudności, swędzenie i senność.
- Podczas stosowania tego leku nie wolno chodzić
- Remifentanyl może powodować problemy z oddychaniem, oddychanie może stać się wolniejsze lub płytsze (rzadko: zatrzymanie oddychania)

Około 13% kobiet doświadcza niewystarczającą ulgę w uśmierzaniu bólu po zastosowaniu remifentanylu i nadal wymaga znieczulenia zewnątrzoponowego

Jakie kontrole są konieczne, jeśli używasz Remifentanylu?

Jeśli stosujesz Remifentanil, pielęgniarka lub położna sprawdzi, czy oddychasz odpowiednio. Poziom tlenu we krwi mierzy się klipsem na palcu. Bicie serca i ciśnienie krwi są również regularnie monitorowane. Jeśli okaże się, że oddychasz gorzej, podawanie Remifentanylu zostanie wstrzymane. Prawdopodobieństwo, że całkowicie przestaniesz oddychać, jest bardzo niskie. Jeśli mimo wszystko do tego dojdzie, wówczas położna lub pielęgniarka pomogą Ci w oddychaniu. Ponieważ Remifentanil zniknie w ciągu kilku minut, oddychanie o własnych siłach szybko powróci. Przez pierwsze pół godziny po rozpoczęciu podawania leków lekarz lub położna pozostanie przy Tobie w pokoju, aby nadzorować sytuację. Pół godziny później w pokoju będzie obecna pielęgniarka.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog.

Geboortecentrum Noord-Limburg

routenummer 88

Bouwlaag 2 Verlosafdeling/ Kraamsuites/ afdeling Gynaecologie

Bouwlaag 3 Polikliniek Verloskunde/ Couveusesuites/ afdeling
Neonatologie

Geboortecentrum Noord Limburg

Professor Gelissensingel 20

5912 JX Venlo

☎ (077) 320 55 55

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl