

Longgeneeskunde

Desensibilisatie

Ongevoelig maken voor bepaalde stoffen

Inleiding

U heeft in overleg met uw arts besloten uw allergische klachten te gaan behandelen. Uw arts heeft u al informatie gegeven wat deze behandeling inhoudt. In deze folder kunt u alles rustig nalezen.

Desensibiliseren

Desensibiliseren betekent “ongevoelig maken voor bepaalde stoffen”. Bij een allergie betekent desensibiliseren dat u ongevoelig gemaakt wordt voor de stof waar u allergisch voor bent. Dit kunnen verschillende stoffen zijn. De meest voorkomende stoffen waarmee patiënten gedesensibiliseerd worden zijn: gras- en/of boompollen, huisstofmijten, bijen- en/of wespengif.

Wesp- en/of bijengif*

Bij wesp- en/of bijengif desensibilisatie wordt u drie weken achter elkaar een dag(-deel) opgenomen op de dagverpleging locatie Venlo. U krijgt ter observatie een infuus en uw bloeddruk wordt na het injecteren van het wesp- en/of bijenallergeen met regelmaat gecontroleerd. Deze opnames kunnen alleen op de locatie Venlo plaatsvinden. Voor de vervolgkuur kunt u zowel in Venlo als in Venray terecht.

De desensibilisatie

De overige desensibilisatiekuren vinden plaats op de longfunctieafdeling in Venlo of Venray.

Een desensibilisatiekuur bestaat uit twee fasen:

1. Een instelfase waarin u wekelijks in sterkte opbouwend een injectie van het allergeen waarvoor u allergisch bent krijgt geïnjecteerd. Deze fase duurt ongeveer drie maanden.
2. Een onderhoudsfase waarin u 1 keer per 4 weken een injectie van het allergeen krijgt toegediend.

Duur van de kuur

De totale kuur duurt drie tot vijf jaar.

Vroegtijdig staken van de kuur

Een hyposensibilisatiekuur kan wanneer daar aanleiding toe is zonder enig probleem direct gestaakt worden. Bedenk wel dat wanneer de kuur niet wordt afgemaakt het opgebouwde beschermingseffect geheel of gedeeltelijk zal verdwijnen.

De kuur

Afhalen kuur

U krijgt van uw arts een recept mee voor een kuur met het betreffende allergeen. U dient dit ruim voor aanvang van de startdatum af te halen bij uw eigen apotheek. Bewaar de vloeistof in de koelkast (niet in de diepvries). Indien nodig krijgt u ook een recept voor een Epipen. Uw arts bespreekt dit met u.

Dag van de injectie

Op de dag van de eerste injectie meldt u zich met de kuur

Locatie Venlo

Longfunctieonderzoek

Locatie Venray

Polikliniek Longgeneeskunde

De longfunctieassistente injecteert volgens schema het allergeen in uw linker en/of rechter bovenarm (bij uitzondering in linker- en/of of rechter bovenbeen). De injecties worden in het algemeen niet als pijnlijk ondervonden. Na de injectie verblijft u een ½ uur in de wachtkamer waar u een kopje koffie of thee kunt nemen. Na een half uur controleert de longfunctieassistente de injectieplaats -(en) op evt. zwelling en roodheid. Deze gegevens worden dan genoteerd in uw dossier. Het allergeen wordt voor u op de afdeling in een koelkast bewaard.

Klachten

Het kan zijn dat u binnen 24 uur alsnog klachten krijgt.

Neem tussen 08.15 en 17.00 uur dan onmiddellijk contact op met de longfunctieafdeling

☎(077) 320 51 28.

Buiten deze tijden dient u contact op te nemen met de Spoedeisende Hulp (SEH)

☎(077) 320 58 10.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen heeft u met uw arts besproken. U kunt deze nalezen in de (patiënten)bijsluiter, die zit ingesloten bij de kuur.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Longfunctieonderzoek

Locatie Venlo

routenummer 53

☎ (077) 320 51 28

Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 44

☎(077) 320 68 23

Locatie Venray

routenummer 19

☎(0478) 52 25 19

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210

5912 BL Venlo

☎(077) 320 55 55

internet: www.viecuri.nl

Locatie Venray

Merseloseweg 130

5801 CE Venray

☎ (0478) 52 22 22