

Oogheelkunde

Behandeling met Lucentis

Informatie en leefregels

Inleiding

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u behandeld gaat worden met Lucentis injecties.

Hoe vaak krijgt u een injectie?

Standaard krijgt u drie injecties als oplaaddosering ongeveer vier tot zes weken na elkaar. Afhankelijk van uw situatie kan uw oogarts beslissen om meer of minder injecties te geven of in een andere frequentie.

De spreekuurassistente zal een aantal afspraken voor u inplannen.

Let op!

Als u tijdens de behandeling met Lucentis andere operaties moet ondergaan, breng dan uw oogarts hiervan op de hoogte. Breng ook andere behandelend artsen op de hoogte van uw behandeling met Lucentis.

Dag van de behandeling

Vorbereiding thuis

- U mag normaal eten en drinken.
- U kunt uw dagelijkse medicijnen (inclusief eventuele oogdruppels) normaal gebruiken.
- Omdat u na de injectie niet zelf aan het verkeer kunt deelnemen is het verstandig van te voren vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis te regelen.

Toediening van de injectie

Toediening van de injectie gebeurt op de operatiekamer van de dagbehandeling in Venlo/ Venray. Op de afdeling dagverpleging wordt het te behandelen oog gemarkeerd en met druppels verdoofd. Op de operatiekamer wordt het oog gedesinfecteerd met betadine (jodium) oplossing (tenzij u daar overgevoelig voor bent). Vervolgens krijgt u een steriele doek over uw gezicht. U kunt hieronder zonder probleem vrij ademen. Met een ooglidspreider (klemmetje) worden de oogleden opengehouden en vervolgens wordt door de oogarts de Lucentis direct in de oogbol (in de glasvochtruimte= de ruimte achter de ooglens) ingespoten. Er kan milde pijn optreden tijdens injectie. In het algemeen is de gehele ingreep nagenoeg pijnloos. Na de injectie mag u naar huis. Houdt u er rekening mee dat u na de behandeling niet zelf mag deelnemen aan het verkeer.

Bijwerkingen / Complicaties

- Door de injectie kan het oog direct rood worden (bloeduitstorting), dit is onschuldig en verdwijnt na ongeveer 1 week.
- De eerste dag na de injectie kunt u iets waziger zien.
- U kunt kleine vlokjes of vlokken in uw beeld zien bewegen. Dit komt regelmatig voor en verdwijnt meestal binnen enkele dagen.
- Het oog zal circa 1 tot 2 dagen geïrriteerd kunnen aanvoelen.

Na de Lucentis injectie mag u twee dagen niet in uw oog wrijven.

Infectie?

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt, kan een infectie optreden. De volgende kenmerken kunnen wijzen op een infectie:

- pus uit het oog;
- toenemende (heftige) pijn/ irritatie in het oog;
- toenemende roodheid;
- toenemende zwelling van het oog;
- toenemend wazig zien of (plotseling) slechter gaan zien;
- sterke overgevoeligheid voor licht.

Neem bij één van deze kenmerken direct contact op met de polikliniek oogheelkunde. Vermeldt hierbij dat u een injectie met Lucentis in het oog heeft gehad.

Als de oogziekte weer actief wordt

Na een succesvolle behandeling kan uw oogziekte na verloop van tijd weer actief worden. Dit uit zich meestal door een snel (binnen enige dagen) optredende verslechtering van de gezichtsscherpte en een toenemende vervorming van het beeld. In dat geval moet u op korte termijn contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde.

Vervolgafspraken

De vervolg afspraken zijn al door de secretaresse met u gemaakt. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde.

Bericht van verhindering

Bent u verhinderd voor de behandeling? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de polikliniek oogheelkunde. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Meer informatie

Maculadegeneratie (MD) vereniging Nederland
voor informatie over LMD

☎ (030) 298 07 07

✉ mdvereniging@macula-degeneratie.nl

website www.mdvereniging.nl

Bijsluiterlijn voor blinden en slechtzienden.

Via de bijsluiterlijn kunt u een gesproken bijsluiter beluisteren. ☎ 0900 0125

Hulpmiddelen voor slechtzienden

Mensen met een eindstadium van LMD kunnen bij lezen en televisie kijken gebruik maken van hulpmiddelen voor slechtzienden, zoals vergrotingsapparaten, telescoopbrillen, grootletterboeken en computers. Het goed en vakkundig aanpassen van zogenaamde “Low Vision” (= slechtziendheid) hulpmiddelen is van groot belang bij mensen met LMD. Daardoor is het mogelijk dat in bepaalde gevallen een patiënt met LMD toch grote letters kan lezen en iets meer van zijn omgeving kan waarnemen. Speciaal opgeleide “low- vision” specialisten zijn daarbij onontbeerlijk.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Oogheelkunde

Locatie Venlo

routennummer 9

☎(077) 320 61 31

Locatie Venray

routennummer 95

☎(0478) 52 23 39

Buiten kantooruren (ook in het weekend en op feestdagen)

Belt u het centrale nummer.

☎ (077) 320 55 55 Vraag naar de dienstdoende oogarts

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210

5912 BL Venlo

☎(077) 320 55 55

internet: www.viecuri.nl

Locatie Venray

Merseloseweg 130

5801 CE Venray

☎ (0478) 52 22 22