

Plastische Chirurgie

Directe wenkbrauwlift

Inleiding

U heeft in overleg met uw arts besloten om een directe wenkbrauwlift te laten verrichten. U heeft al informatie gekregen van uw behandelend arts. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen.

Waarom een directe wenkbrauwlift?

Indien er sprake is van laagstand van de wenkbrauwen kan dit leiden tot verschillende klachten, waaronder:

- vermoeide ogen
- hoofdpijn
- gezichtsveld beperking

De laagstand van de wenkbrauwen kan gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel een directe wenkbrauwlift. Hierbij worden de wenkbrauwen omhoog verplaatst en op het botvlies vast gehecht. Soms wordt een directe wenkbrauwlift gecombineerd met een bovenooglidcorrectie (blepharoplastiek)

Verwachting

Het resultaat van een directe wenkbrauwlift is meestal langdurig. Toch kan een nieuwe directe wenkbrauwlift nodig zijn als de klachten recidiveren

Vergoeding

De kosten van een directe wenkbrauwlift worden alleen door de ziektekostenverzekeraars vergoed als er sprake is van een medische indicatie. Of de kosten voor de directe wenkbrauwlift worden vergoed is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de dekking. Wij adviseren u om altijd voor de ingreep aan uw zorgverzekeraar te vragen of de operatie wordt vergoed.

Risico's en complicaties

- Een meer dan normale bloedlekkage kan soms achteraf voorkomen. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de wenkbrauwen en oogleden er weer normaal uitzien.
- De wenkbrauwen kunnen niet geheel symmetrisch zijn.
- Door littekenreactie kan de wenkbrauw wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal over is.
- U kunt last krijgen van gevoelloosheid van het voorhoofd of wat vochtophoping. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf.

- In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan chirurgisch verwijderd worden.
- Infectie.

Vorbereiding

Een directe wenkbrauwlift zal meestal onder plaatselijke verdoving plaatsvinden op de dagverpleging. Soms is een volledige anesthesie (narcose) nodig.

Preoperatief bureau

Als narcose nodig is wordt u vanuit de polikliniek en voor de opname in het ziekenhuis doorverwezen naar het preoperatief bureau. Het is belangrijk om u als patiënt zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op de aanstaande ingreep en de vorm van anesthesie die nodig is. Hiervoor is preoperatief onderzoek nodig. Door dit onderzoek is de kans op problemen tijdens en na de ingreep zo klein mogelijk. Meer informatie vindt u in de folder "preoperatief onderzoek en anesthesie".

Bloedverdunnende medicijnen

Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u uitsluitend in overleg met u arts, voor de ingreep stoppen. Als u onder begeleiding staat van de trombosedienst informeer deze dan over de ingreep. De trombosedienst stemt dan het beleid af.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen, omdat u in geen geval zelf naar huis mag rijden. Reizen met openbaar vervoer raden wij ook af.

Opnameduur

Bij plaatselijke verdoving kunt u gelijk na de ingreep weer naar huis, zorg wel voor vervoer en begeleiding. Bij algehele anesthesie vindt de ingreep plaats op de dagbehandeling. Dit betekent dat u, als alles naar wens verloopt, u na de ingreep weer naar huis mag. In de folder 'Dagverpleging' vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling.

De ingreep

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat weggenomen moet worden. Bij de operatie wordt een snee net boven de wenkbrauw gemaakt. Het huidoverschot kan nu weggehaald worden. Meestal wordt de wenkbrauw ook gelift door middel van het vasthechten op het botvlies. Hierna wordt de huid weer gehecht. Het grootste deel van het litteken komt net boven de wenkbrauw te liggen. Zeker het eerste half jaar is het litteken rood en duidelijk zichtbaar. Hierna wordt het litteken minder rood en dus minder zichtbaar.

Na de ingreep

Na een directe wenkbrauwlift kan het operatie gebied dik, blauw en gezwollen zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat ook de oogleden gezwollen zijn (omdat het vocht naar beneden zakt). Het wondgebied moet droog blijven voor de rest kunt u gewoon douchen. Het verdient de aanbeveling om thuis de eerste dagen te koelen met een ijsbril of diepvrieserwtten. Druk verhogende momenten moeten worden voorkomen (bukken, persen zwaar tillen) De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Na ongeveer 10 dagen worden de hechtingen verwijderd.

Twee weken nadat de hechtingen eruit zijn gehaald kan het litteken eventueel met een zalf of crème dun ingesmeerd en voorzichtig gemasseerd worden.

Pijnbestrijding

Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol (500 mg) is vaak voldoende.

Weer thuis

Het is verstandig de dag van de ingreep rustig aan te doen. In de komende dagen kunt u uw normale bezigheden langzaam opbouwen.

Poliklinische afspraak

Na ongeveer tien dagen komt u ter controle naar de polikliniek plastische chirurgie. Hier worden de pleisters en hechtingen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak bij het verlaten van de afdeling.

Tot slot

Deze folder bevat algemene informatie. Voor u persoonlijk kan de situatie net iets anders zijn. Aan deze voorlichting kunt u dan ook geen rechten ontleen.

Esthetische en plastische chirurgie is geen exacte wetenschap. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de plastische chirurgen werken kan nooit garantie op resultaten en een ongestoord verloop van de genezing gegeven worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Plastische Chirurgie en VieCuri Mooi		
Locatie Venlo	routennummer 76	☎ (077) 320 68 65
Locatie Venray	routennummer 53	☎ (077) 320 68 65

In VieCuri Medisch Centrum stimuleren we onze patiënten om meer te bewegen, zowel vóór, tijdens als ná hun ziekenhuisopname. Meer informatie: www.viecuri.nl/bewegen

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl