

Radiologie

Barbotage van de schouder

Echografische behandeling van kalkafzetting in de schouder

Let op de locatie waar uw onderzoek plaatsvindt.

U krijgt binnenkort een barbotage behandeling van uw schouder. Lees de informatie goed door en bewaar de informatie, zodat u het nog eens kunt nalezen.

Wat is een barbotage behandeling van de schouder?

U heeft schouderklachten die veroorzaakt worden kalkafzettingen in de schouder. Een barbotage behandeling van de schouder heeft als doel de kalkafzettingen in de schouder op te lossen. Met een echografie worden de kalkafzettingen opgespoord. Daarna worden kalkafzettingen aangeprikt en zoveel mogelijk uitgespoeld. Door het aanprikken en spoelen wordt de genezing van de schouderpees op gang gebracht. Hierdoor verdwijnen op termijn de pijnklachten. De behandeling wordt gedaan door de radioloog.

Wat kunt u verwachten van de behandeling?

Het resultaat van een barbotage behandeling is meestal goed (70% tot 80% van de patiënten zijn tevreden). Zij ervaren minder pijn en kunnen de schouder beter gebruiken. Wel kan het herstel lang duren van 6 weken tot 1 jaar.

Het onderzoek

Met een echografie wordt de grootte en de plaats van de kalkafzetting bepaald. De huid wordt eerst ontsmet. Daarna krijgt u met een prik een verdoving in de schouder en wordt met de naald meerdere keren in de kalk in de pees geprikt. Daarbij wordt vloeistof door de pees gespoeld en kan soms een deel van de kalk uit de pees worden gespoeld. Door de reactie van het lichaam op het prikken, wordt de rest van de kalk langzaam door het lichaam opgenomen. Aan het eind van de behandeling wordt een medicijn in de slijmbeurs van de schouder gespoten om de klachten te beperken en het proces te bespoedigen. Dit proces geeft de eerste tijd meer pijn dan u had. Dit duurt soms tot twee weken na de behandeling. Langzaam nemen de pijnklachten af en verdwijnt de kalk.

Vorbereiding

1. Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden. Regel daarom zelf iemand die u brengt en ophaalt uit het ziekenhuis.
2. Bent u overgevoelig voor jodium, pleister, latex of medicijnen? Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (antistolling)? Vertel dit dan tijdens het gesprek met uw orthopedisch chirurg.
3. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt die via de trombosedienst worden gecontroleerd, dan stopt u deze 5 dagen voor de behandeling. Doe dit wel in overleg met de arts van wie u de bloedverdunnende medicijnen voorgeschreven krijgt. Bijvoorbeeld de internist, cardioloog, neuroloog of huisarts. Is stoppen niet mogelijk, geef dit dan door aan uw orthopedisch chirurg.
4. Bent u diabeet? Bij de behandeling wordt een corticosteroïd injectie gegeven in de slijmbeurs van de schouder. Dit kan zorgen voor een schommeling in de suikerspiegels. Controleer daarom gedurende enkele dagen de suikerspiegels regelmatig en overleg zonnodig met uw behandelend arts.

De dag van de behandeling

Op de dag van de behandeling mag u gewoon eten en drinken. Ook nog voor de behandeling. Ook uw medicijnen mag u gewoon gebruiken, tenzij er iets anders met u is afgesproken.

Na het onderzoek

Pijnstilling

Bij pijnklachten mag u thuis paracetamol tot maximaal 4x per dag 1000 mg gebruiken. Als dit onvoldoende is, kan dit worden aangevuld met een ontstekingsremmer in overleg met de orthopedisch chirurg of uw huisarts.

Bewegen

De eerste 7 dagen na de behandeling mag u uw schouder niet te zwaar belasten. U mag de schouder alleen binnen de pijngrenzen gebruiken. Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is. Het is heel normaal dat de schouder de eerste 6 weken gevoelig is. De schouder kan zelfs tot enkele maanden na activiteit gevoelig blijven.

Controle op de polikliniek

Na ongeveer 6 weken heeft u de controle afspraak bij de orthopedisch chirurg. Een half uur voor de afspraak laat u een röntgenfoto maken op de afdeling Radiologie. Tijdens de controle wordt gekeken of de hoeveelheid kalk is afgenomen.

Mogelijke complicaties

Bij iedere behandeling kunnen complicaties optreden. Bij barbotage behandeling is de kans hierop zeer klein. Mogelijke complicaties zijn:

- Bloeding tijdens de behandeling of direct erna.
- Infectie van de schouder na behandeling.
- Het ontstaan van een nieuwe verkalking.

Vragen

Het is belangrijk dat u de juiste en duidelijke informatie krijgt. Heeft u na het gesprek met de orthopedisch chirurg en het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van te voren op, zodat u niets vergeet.

Voor algemene vragen, afspraak maken of verzetten bel dan naar:

Afdeling Radiologie		
Locatie Venlo	routennummer 79	☎ (077) 320 68 40

Heeft u na uw behandeling een dringend probleem in de avond of nacht? Belt u dan met de Huisartsenpost.

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl