

Radiologie

Injectie medicatie echo

medicatietoediening via injectie

Inleiding

Uw behandelend arts heeft voor u een injectie medicatie onder echografie aangevraagd.

Hieronder wordt de normale werkwijze beschreven. Het kan zijn dat de behandeling bij u net iets anders is.

Doel van de behandeling

Doel van de behandeling is de genezing op gang brengen en/of pijnstilling te geven. De juiste plaats voor de injectie medicatie wordt in deze situatie met behulp van echografie bepaald.

Vorbereiding

U hoeft voor dit onderzoek geen voorbereidingen te treffen. U mag eventuele medicijnen normaal innemen, tenzij anders is afgesproken.

Bloedverdunners

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met de bloed verdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dit dan met deze arts.

Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan op tijd bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat zodat u tijdig kunt stoppen met de medicatie.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling medische beeldvorming.

In de voorbereidingsruimte wordt u gevraagd om een deel uw kleding gedeeltelijk uit te doen. Welke kleding uit moet en wat u aan kunt houden, is afhankelijk van het lichaamsdeel dat behandeld wordt.

In de echografiekamer ligt u op een onderzoekstafel. Op uw huid wordt koude echogel aangebracht. Deze gel dient om de geluidsgolven goed te geleiden. Daardoor kunnen de verschillende organen en/of structuren goed worden afgebeeld. De beelden worden zichtbaar op een beeldscherm en van deze beelden worden foto's gemaakt.

De radioloog beweegt met een zogenaamde transducer over de huid om de juiste plaats voor de injectie medicatie te bepalen. Als de juiste plaats bepaald is, wordt de huid ontsmet met alcohol.

De radioloog prikt met een naald de plek aan. Dit prikken kan even pijn doen. Er wordt een vloeistof ingespoten dat een mengsel is van een verdoving en een ontstekingsremmer. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en de behandeling is klaar.

De behandeling duurt ongeveer 10-15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis.

U kunt tijdelijk een verdoofd gevoel hebben op de plek waar geprikt is. Het is belangrijk om te weten dat de pijn na enige uren terug kan komen, soms heviger dan voorheen. Het verdovingsmiddel werkt namelijk een paar uur (net als een tandartsverdoving) en de ontstekingsremmer gaat pas na een paar dagen werken. Het is daarom mogelijk dat er de eerste week niet veel veranderd en het gewenste effect pas na een week optreedt.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden na de procedure. Het is daarom fijn om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis die u ook naar huis kan begeleiden.

Diabetes

Bij deze behandeling wordt een ontstekingsremmer toegediend in de slijmbeurs van de schouder. Dit kan zorgen voor een schommeling in de suikerspiegels. U moet daarom gedurende enkele dagen de suikerspiegels regelmatig controleren en zo nodig overleggen met uw behandelend arts.

Controle afspraak

U krijgt na een paar weken een (bel)afspraak met uw behandelend arts om te bespreken hoe het na de injectie medicatie is gegaan.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt inplannen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Afdeling Radiologie		
Locatie Venlo	routennummer 79	☎ (077) 320 68 40
Locatie Venray	routennummer 10	☎ (0478) 52 24 53

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl