

## Radiologie

# Marcaïnisatie

## Verdoxing van een gewricht

### Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat er een verdovende vloeistof wordt ingespoten in het gewricht van de rug of de heup.

*Hieronder wordt de normale werkwijze beschreven. Het kan zijn dat het onderzoek bij u net iets anders is.*

### Doel van het onderzoek

Een marcaïnisatie is een onderzoek waarbij uw arts een injectie met verdovende vloeistof (marcaïne) in uw heupgewricht of ruggenwervel geeft. Hierna kan de arts aan de hand van uw ervaringen beoordelen of het probleem uit de rug of uit de heup komt.

### Zwanger

Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, bel dan van tevoren met de afdeling Medische Beeldvorming om te bespreken of het onderzoek door kan gaan.

### Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

### Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling medische beeldvorming.

In de voorbereidingsruimte wordt u gevraagd om een deel van uw kleding uit te doen. Welke kleding uit moet en wat u aan kunt houden, is afhankelijk van het lichaamsdeel dat onderzocht wordt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedisch chirurg of een orthopedisch chirurg in opleiding. U ligt op de onderzoekstafel waarbij het af te beelden gebied met röntgenstraling in beeld wordt gebracht. Vervolgens wordt de plaats van de injectie gedesinfecteerd met een vloeistof (chloorhexidine). De arts prikt met een dunne naald in het heupgewricht of in de rug. Onder röntgendoorlichting wordt gekeken of de naald op de juiste plek zit. Als de naald op de juiste plek zit, wordt een vloeistof ingespoten. Het kan zijn dat daar ook een ontstekingsremmer aan wordt toegevoegd. Daarna wordt de naald weer verwijderd. Er wordt een pleister op het prikgaatje geplakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

**Na het onderzoek**

Geef uw gewricht op de dag van het onderzoek wat rust. Bij sommige mensen is het gewricht wat stijf of pijnlijk; dat gaat vanzelf weer over. U kunt na de injectie last hebben van een branderig of "vol" gevoel op de plaats waar de naald(en) is/zijn ingebracht. Mocht dit optreden, dan zal dit gevoel vanzelf weer verdwijnen binnen enkele dagen. Ook kunt u het gevoel hebben "opvliegers" te krijgen, afhankelijk of er een ontstekingsremmende vloeistof is ingespoten. Dit zijn allemaal kortdurende en onschadelijke bijwerkingen.

**Vervoer naar huis**

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden na de procedure. Het is daarom fijn om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis die u ook naar huis kan begeleiden.

**Diabetes**

Als er een ontstekingsremmer is toegediend, kan dit zorgen voor een schommeling in de suikerspiegels. U moet daarom gedurende enkele dagen de suikerspiegels regelmatig controleren en zo nodig overleggen met uw behandelend arts.

**Controle afspraak**

U krijgt na een paar weken een (bel)afspraak met uw behandelend arts om te bespreken hoe het na de marcaïnisatie is gegaan.

**Bent u verhinderd?**

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt inplannen.

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

<b>Afdeling Radiologie</b>		
<b>Locatie Venlo</b>	routennummer 79	☎ (077) 320 68 40
<b>Locatie Venray</b>	routennummer 10	☎ (0478) 52 24 53

## VieCuri Medisch Centrum

### Locatie Venlo

Tegelseweg 210  
5912 BL Venlo  
☎ (077) 320 55 55

### Locatie Venray

Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)

Bekijk uw medische gegevens op [www.mijnviecuri.nl](http://www.mijnviecuri.nl)