Radiologie

Jodium- / contrastvloeistofallergie?

Voorzorgsmaatregelen bij onderzoek met contrastvloeistof

Inleiding
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een röntgenonderzoek gaat plaatsvinden, waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten. U heeft een jodium- of contrastallergie. U heeft al uitleg gehad van uw behandelend arts welke voorzorgsmaatregelen genomen worden.
In deze folder kunt u alles nalezen.

Allergie
U krijgt een onderzoek, waarbij een contrastvloeistof wordt gebruikt. Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden omdat:

- U heeft aangegeven dat u een allergie heeft voor jodium en/of contrastvloeistof.
- Bij het inplannen van het onderzoek uit ons systeem bleek dat u een jodium- en/of contrastvloeistofallergie heeft.

Bij een allergie voor een contrastmiddel kan het beste gekozen worden voor een beeldvormende techniek waarbij geen gebruik wordt gemaakt van contrastmiddel, omdat bijna alle contrastmiddelen jodium bevatten. Als dit niet mogelijk is en toch een onderzoek nodig is, waarbij een contrastmiddel wordt gebruik, dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden.

Voorzorgsmaatregelen
Om reacties, bij het gebruik van een contrastmiddel, te beperken krijgt u medicijnen die u voor het onderzoek thuis dient in te nemen.

Uw behandelend arts of de spreekuurassistente geeft u een recept voor Prednison (50 mg). U kunt de medicijnen ophalen bij uw apotheek.

***V*oorbereiding**
Uw behandelend arts of de spreekuurassistente belt u wanneer en hoe laat het onderzoek gaat plaatsvinden. U krijgt een bevestiging en controle afspraak thuisgestuurd.

De dag vóór het onderzoek neemt u 12 uur, 7 uur en 1 uur voor het onderzoek een tablet Prednison (50 mg) in.

Bewaar de lege verpakking en neem deze mee naar het ziekenhuis. Als u de tabletjes niet heeft ingenomen of de lege verpakking niet bij u heeft op de afdeling dan kan het onderzoek, voor uw eigen veiligheid, niet doorgaan.

Voorbeeld
Wanneer het onderzoek om 10.00 uur plaatsvindt, moet het eerste tabletje geslikt worden om 22.00 uur ’s avonds en het tweede tabletje om 03.00 uur 's nachts.

Dag van het onderzoek
- U meldt zich bij de receptie in de hal van het ziekenhuis.
- Op de afdeling vraagt de verpleegkundige u wanneer u uw medicijnen heeft ingenomen en vraagt u naar de lege verpakking van de twee tabletjes.

Op de afdeling
- Krijgt u een infuus met zoutoplossing in de arm of hand.
- Neemt u één uur voor het onderzoek de derde tablet Prednison in.
- Krijgt u ½ uur voor het onderzoek via het infuus een medicijn toegediend: 2 mg Tavegil.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de röntgenafdeling. U wordt hier naartoe gebracht.

Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling. Het (waak)infuus blijft nog twee uur zitten.

Naar huis
Als er geen reacties optreden mag u twee uur na het onderzoek naar huis.

Vragen?

Heeft u vragen over de voorzorgsmaatregelen of de opname neem dan contact op met uw arts of stel de vragen tijdens uw opname aan de verpleegkundige op de afdeling.

Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met:

Afdeling Radiologie		
Locatie Venlo	routenummer 79	☎ (077) 320 68 40
Locatie Venray	routenummer 10	☎ (0478) 52 24 53

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎(077) 320 55 55

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl

© VieCuri Patiëntencommunicatie
24 januari 2023 bestelnummer 12745