

Radiologie

Slikfoto's

Röntgenonderzoek van de slokdarm en maag

Inleiding

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek voor de slokdarm (oesophagus) en maag aangevraagd.

Hieronder wordt de normale werkwijze beschreven. Het kan zijn dat het onderzoek bij u net iets anders is.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek worden door middel van röntgenstralen en drinkbaar contrastmiddel afbeeldingen gemaakt van de slokdarm en maag. Het onderzoek wordt verricht om de functionaliteit van de slokdarm en de maag te beoordelen, vaak naar aanleiding van bijvoorbeeld slikklachten.

Zwanger

Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, bel dan van tevoren met de afdeling Medische Beeldvorming om te bespreken of het onderzoek door kan gaan.

Vorbereiding

Volwassenen: Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 00.00u 's nachts niet meer mag eten, drinken en roken. U mag ook geen kauwgom gebruiken. Alleen tandenpoetsen en mondspoelen is toegestaan.

Kinderen: Het wordt aanbevolen om kinderen en zuigelingen 3 uur voorafgaand aan het onderzoek te onthouden van voeding, zodat zij tijdens het onderzoek hongergevoel hebben. Neemt u voor het onderzoek ook een drinkflesje mee waar uw kind goed uit drinkt. Dit mag een rietjesbeker zijn.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Medische beeldvorming.

In de voorbereidingsruimte wordt u gevraagd om uw bovenkleding uit te doen. Een hemd of T-shirt zonder knoopjes of rits mag u aanhouden. Vrouwen doen er goed aan een beha zonder beugels en metalen haakjes te dragen. De beha moet anders voor het onderzoek uitgedaan worden.

De slokdarm en maag worden op een röntgenfoto zichtbaar gemaakt door deze te vullen met een vloeibaar contrastmiddel, bariumpap. U krijgt hiervan meer malen

slokjes te drinken. De slokdarm en de maag worden in verschillende posities gefotografeerd. De opnamen worden zowel staand als liggend gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

De eerste dagen na het onderzoek kan de ontlasting door de bariumpap wit gekleurd zijn. U hoeft zich daarover niet ongerust te maken. Om ervoor te zorgen dat de contrastvloeistof niet gaat indikken, is het belangrijk dat u de eerste 2 dagen minimaal 2 liter per dag drinkt.

Als u na 2 dagen echter nog geen ontlasting hebt gehad, is het verstandig om een laxeermiddel te gebruiken. Dit is verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw behandelend arts.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt inplannen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Afdeling Radiologie		
Locatie Venlo	routennummer 79	☎ (077) 320 68 40
Locatie Venray	routennummer 10	☎ (0478) 52 24 53

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl