

Reumatologie

Allopurinol

Informatie bij het gebruik van allopurinol

Inleiding

U heeft met uw arts afgesproken dat u allopurinol gaat gebruiken voor de behandeling van uw jicht.

Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een aanvulling op de informatie in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet de bijsluiter. Lees dus naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Allupurinol

De werking van hydroxychloroquine

Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuurgehalte in het bloed.

Een acute jichtaanval wordt behandeld met colchicine en/of ontstekingsremmende pijnstillers.

Wanneer jichtaanvallen veel voorkomen, bij gewrichtsschade door jicht en bij aanwezigheid van jichtknobbeltjes (tophi) is een behandeling met urinezuur verlagende medicijnen nodig om in de toekomst aanvallen te voorkomen en schade te beperken. Allopurinol is een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in uw lichaam verlaagt.

Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het lichaam is afgenomen, zullen er geen jichtaanvallen meer optreden en zullen eventuele jichtknobbeltjes (tophi) verdwijnen. Het is daarvoor echter belangrijk het middel te blijven innemen in de door de arts voorgeschreven hoeveelheid.

Als u het gebruik staakt of het vaak vergeet in te nemen, zullen de jichtaanvallen terugkomen. U zult daarom allopurinol blijvend moeten gebruiken, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert.

Het gebruik van allopurinol

Allopurinol wordt toegediend in tabletten van 100mg, 200mg of 300mg. Neem de tabletten na de maaltijd. De tabletten kunnen met water worden ingenomen.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

In het begin van de behandeling met allopurinol kunnen jichtaanvallen worden uitgelokt. Daarom zult u bij aanvang ook colchicine voorgeschreven krijgen. Dit

middel moet u erbij blijven gebruiken totdat het urinezuur in uw lichaam de normale hoeveelheid heeft bereikt en u gedurende langere tijd geen aanvallen meer hebt gehad.

Allopurinol kan in combinatie met de meeste geneesmiddelen gebruikt worden.

Er zijn echter enkele geneesmiddelen waarvan de werking door allopurinol beïnvloed wordt.

Vertel uw huisarts of specialist en eventueel de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van allopurinol vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De mogelijke bijwerkingen zijn:

- maag en darmklachten (dit kan verminderen door de tabletten in te nemen na de maaltijd).
- allergische huid reacties zoals huiduitslag en exantheem

Zelden (0,01–0,1%):

- ernstige overgevoeligheidsreacties met vervelling, koorts, gewrichtspijn en ernstige huid uitslag.

Bij optreden van huiduitslag

of andere overgevoeligheidsreacties de behandeling onmiddellijk staken en contact nemen met uw reumatoloog.

Controles

Om te bepalen welke dosis allopurinol u nodig hebt om het urinezuur in uw lichaam te verlagen, wordt er in het begin van de behandeling regelmatig bloedonderzoek worden. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis aangepast. Ook daarna wordt (minimaal één keer per jaar) uw bloed gecontroleerd.

De bloedcontroles vinden plaats voorafgaand aan uw poliklinische bezoek of telefonische afspraak bij uw behandelaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Reumatologie		
Locatie Venlo	routennummer 53	☎ (077) 320 59 32
Locatie Venray	routennummer 6	☎ (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

internet: www.viecuri.nl