

## Reumatologie

# Benzbromaron (Desuric)

## Informatie bij gebruik van bensbromaron

### Inleiding

U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u benzbromaron gaat gebruiken voor de behandeling van uw jicht. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een aanvulling op de informatie in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet de bijsluiter. Lees dus naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

### Benzbromaron

#### De werking van hydroxychloroquine

Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuurgehalte in het bloed.

Een acute jichtaanval wordt behandeld met colchicine en/of ontstekingsremmende pijnstillers.

Wanneer jichtaanvallen veel voorkomen, bij gewrichtsschade door jicht en bij aanwezigheid van jichtknobbeltjes (tophi) is een behandeling met urinezuur verlagende medicijnen nodig om in de toekomst aanvallen te voorkomen en schade te beperken. Benzbromaron is een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in uw lichaam verlaagt.

Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het lichaam is afgenomen, zullen er geen jichtaanvallen meer optreden en zullen eventuele jichtknobbeltjes (tophi) verdwijnen. Het is daarvoor echter belangrijk het middel te blijven innemen in de door de arts voorgeschreven hoeveelheid.

Als u het gebruik staakt of het vaak vergeet in te nemen, zullen de jichtaanvallen terugkomen. U zult daarom benzbromaron blijvend moeten gebruiken, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert.

Benzbromaron wordt gebruikt voor behandeling van jicht bij volwassen patiënten die allergisch zijn voor allopurinol, of een contra-indicatie hebben voor allopurinol, of bij wie allopurinol onvoldoende resultaat of onaanvaardbare bijwerkingen geeft.

#### Het gebruik van Benzbromaron

Benzbromaron wordt toegediend in tabletten van 100mg. Neem de tablet eenmalig tijdens de ontbijt.

### **Gebruik samen met andere geneesmiddelen**

In het begin van de behandeling met benzbromaron kunnen jichtaanvallen worden uitgelokt. Daarom zult u bij aanvang ook colchicine voorgeschreven krijgen. Dit middel moet u erbij blijven gebruiken totdat het urinezuur in uw lichaam de normale hoeveelheid heeft bereikt en u gedurende langere tijd geen aanvallen meer hebt gehad.

Benzbromaron kan in combinatie met de meeste geneesmiddelen gebruikt worden. Er zijn echter enkele geneesmiddelen waarvan de werking door benzbromaron beïnvloed wordt.

Vertel uw huisarts of specialist en eventueel de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

### **Mogelijke bijwerkingen**

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van allopurinol vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- maag en darmklachten, zoals diarree
- allergische huid reacties
- urolithiasis, nierkoliek
- zelden: ernstige leverbeschadiging

### **Controles**

Om te bepalen welke dosis allopurinol u nodig hebt om het urinezuur in uw lichaam te verlagen, wordt er in het begin van de behandeling regelmatig bloedonderzoek worden. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis aangepast. Ook daarna wordt (minimaal één keer per jaar) uw bloed gecontroleerd.

De bloedcontroles vinden plaats voorafgaand aan uw poliklinische bezoek of telefonische afspraak bij uw behandelaar.

In verband met het eventueel optreden van (ernstige) leverbeschadiging voor begin van en gedurende de behandeling de leverfunctie controleren (ALAT, ASAT, alkalische fosfatase, totaal bilirubine en  $\gamma$ -GT).

### **Contact opnemen met de reumatoloog**

Neem direct contact op met de polikliniek Reumatologie bij

- braken
- misselijkheid
- abdominale pijn (ernstige buikpijn)
- asthenie (verlies van kracht, zwakte, vermoeidheid, gebrek aan energie)
- geelzucht

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

<b>Polikliniek Reumatologie</b>		
<b>Locatie Venlo</b>	routenummer 53	☎ (077) 320 59 32
<b>Locatie Venray</b>	routenummer 6	☎ (0478) 52 22 86

## VieCuri Medisch Centrum

### **Locatie Venlo**

Tegelseweg 210  
5912 BL Venlo  
☎ (077) 320 55 55

### **Locatie Venray**

Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
☎ (0478) 52 22 22

internet: [www.viecuri.nl](http://www.viecuri.nl)