

Reumatologie

Colchicine

Informatie bij het gebruik van colchicine

Inleiding

U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u colchicine gaat gebruiken voor de behandeling van uw jicht. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een aanvulling op de informatie in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet de bijsluiter. Lees dus naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Colchicine

De werking van colchicine

Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuur gehalte in het bloed.

Een acute jichtaanval wordt behandeld met colchicine en/of ontstekingsremmende pijnstillers.

Colchicine wordt gebruikt bij de behandeling van een acute jichtaanval en daarnaast ter voorkoming van een jichtaanval bij het begin van urinezuur verlagende therapie. Colchicine werkt snel, vaak al binnen een dag.

Het gebruik van colchicine

Colchicine wordt toegediend in tabletten van 0.5mg.

Uw reumatoloog vertelt u hoeveel tabletten per dag u moet innemen. De dosis wordt aangepast als u last hebt van bijwerkingen. U kunt de tabletten tijdens de maaltijd met water innemen.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

U kunt colchicine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Enkele geneesmiddelen, waaronder cholesterolverlagers, geven in combinatie met colchicine zeer zelden spierklachten. Overleg in dat geval met uw huisarts of specialist.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van colchicine vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- maag en darmklachten zoals misselijkheid en diarree

Heeft u last van aanhoudende diarree en/of misselijkheid, dan kunt u de dosering in overleg met uw arts verminderen

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van colchicine kan in zeldzame gevallen de vruchtbaarheid van de man verminderen. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt ontraden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Reumatologie		
Locatie Venlo	routenummer 53	☎ (077) 320 59 32
Locatie Venray	routenummer 6	☎ (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

internet: www.viecuri.nl