

Reumatologie

Febuxostat

Informatie bij het gebruik van febuxostat

Inleiding

U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u febuxostat gaat gebruiken voor de behandeling van uw jicht. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een aanvulling op de informatie in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet de bijsluiter. Lees dus naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Febuxostat

De werking van febuxostat

Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuurgehalte in het bloed.

Een acute jichtaanval wordt behandeld met colchicine en/of ontstekingsremmende pijnstillers.

Wanneer jichtaanvallen veel voorkomen, bij gewrichtsschade door jicht en bij aanwezigheid van jichtknobbeltjes (tophi) is een behandeling met urinezuurverlagende medicijnen nodig om in de toekomst aanvallen te voorkomen en schade te beperken. Febuxostat is een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in uw lichaam verlaagt.

Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het lichaam is afgenomen, zullen er geen jichtaanvallen meer optreden en zullen eventuele jichtknobbeltjes (tophi) verdwijnen. Het is daarvoor echter belangrijk het middel te blijven innemen in de door de arts voorgeschreven hoeveelheid.

Als u het gebruik staakt of het vaak vergeet in te nemen, zullen de jichtaanvallen terugkomen. U zult daarom benzbromaron blijvend moeten gebruiken, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert.

Febuxostat wordt gebruikt voor behandeling van jicht bij volwassen patiënten die allergisch zijn voor allopurinol, of een contra-indicatie hebben voor allopurinol, of bij wie allopurinol onvoldoende resultaat of onaanvaardbare bijwerkingen geeft. De medicijn wordt ook gebruikt voor preventie en behandeling van hyperurikemie bij volwassenen die chemotherapie ondergaan voor hematologische maligne aandoeningen met een middelmatig tot hoog risico van tumorlyssyndroom (TLS).

Het gebruik van febuxostat

Febuxostat wordt toegediend in tabletten van 80mg en 120 mg. De tabletten kunnen met of zonder voedsel kan worden ingenomen.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

Febuxostat kan in combinatie met de meeste geneesmiddelen gebruikt worden.

Er zijn echter enkele geneesmiddelen waarvan de werking door febuxostat beïnvloed wordt.

Vertel uw huisarts of specialist en eventueel de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van febuxostat vermeld die ooit zijn voorgekomen.

Meest voorkomende bijwerkingen

- maag en darmklachten, zoals diarree, misselijkheid, buikpijn, braken
- huiduitslag, oedeem
- leverfunctie afwijkingen

Zelden voorkomende bijwerkingen

- atriumfibrilleren
- palpitaties (hartkloppingen)
- afwijkend ECG
- hypertensie

Controles

Om te bepalen welke dosis febuxostat u nodig hebt om het urinezuur in uw lichaam te verlagen, wordt er in het begin van de behandeling regelmatig bloedonderzoek worden. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis aangepast. Ook daarna wordt (minimaal één keer per jaar) uw bloed gecontroleerd.

De bloedcontroles vinden plaats voorafgaand aan uw poliklinische bezoek of telefonische afspraak bij uw behandelaar.

Behandeling met febuxostat wordt niet aanbevolen bij ischemische hartziekte of hartfalen. Bij patiënten met schildklierandoeningen en patiënten met kans op tumorlyssyndroom moet ook een hartmonitoring voor en tijdens behandeling met febuxostat.

Contact opnemen met de reumatoloog bij

- Palpitaties(hartkloppingen)
- Drukgevoel op de borst
- Huiduitslag met koorts

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Reumatologie		
Locatie Venlo	routennummer 53	☎ (077) 320 59 32
Locatie Venray	routennummer 6	☎ (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

internet: www.viecuri.nl