Reumatologie

Hydroxychloroquine (Plaquenil)

Informatie bij het gebruik van hydroxychlroquine

Inleiding

U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u hydroxychloroquine gaat gebruiken voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een aanvulling op de informatie in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet de bijsluiter. Lees dus naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Hydroxychloroquine (Plaquenil ®)

De werking van hydroxychloroquine
Hydroxychloroquine behoort tot de groep van langzaam werkende antireumatische geneesmiddelen. Na enige tijd kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken.
Als u pijnstillers/NSAID's gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken.
Indien Hydroxychloroquine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het niet werkt of u teveel last heeft van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik stop te zetten. Hydroxychloroquine wordt behalve bij reumatische aandoeningen ook gebruikt bij bepaalde huidziekten en malaria.

Het gebruik van hydroxychloroquine
Hydroxychloroquine wordt toegediend in dragees van 200mg een tot tweemaal daags. Neem de dragees na de maaltijd in met water of melk, elke dag op ongeveer dezelfde tijd. Als u vergeten bent de dragees in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip dezelfde dag nog in. De dag erna volgens voorschrift.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u Hydroxychloroquine in combinatie met veel geneesmiddelen gebruiken.
Vertel uw huisarts, specialist en de trombosedienst daarom altijd welke medicijnen u gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Hydroxychloroquine vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De meest voorkomende bijwerkingen

- Maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree
- huiduitslag en jeuk
- hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid of sufheid
- overgevoeligheid voor zonlicht
- problemen met de ogen zoals nachtblindheid, dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen (‘s avonds)

Als een of meer van deze klachten langdurig aanhoudt, moet u uw reumatoloog hiervan op de hoogte brengen.

Neem contact op met de polikliniek Reumatologie bij

- nachtblindheid, dubbel of wazig zien
- het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen (s’ avonds)

Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van hydroxychloroquine. Noteer dan wel op welke dag u bent gestopt en waarom. Neem contact op met de polikliek Reumatologie.

Controles

Oogproblemen

Ernstige oogproblemen komen bij de gebruikelijke dosis vrijwel nooit voor. Bij mensen met oogafwijkingen is meestal voor de behandeling met hydroxychloroquine een controle bij de oogarts nodig.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover tot op heden bekend is, heeft hydroxychloroquine waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Schadelijke effecten zijn niet beschreven voor hydroxychloroquine gebruik tijdens de zwangerschap. Het is belangrijk om met uw reumatoloog te overleggen als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. U kunt beter geen hydroxychloroquine gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden. Overleg de situatie met uw reumatoloog.

Aanvullende informatie:

Invloed op de ogen
Om de invloed van hydroxychloroquine op de ogen te verminderen, is het beter fel zonlicht op uw ogen te vermijden. Draag daarom vaker een zonnebril.

Gebruik van alcohol
Alcohol heeft geen ongunstige invloed op de werking van hydroxychloroquine.

Bewaren van medicijnen
Bewaar medicijnen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen. Voor kleine kinderen kan het slikken van enkele dragees hydroxychloroquine levensbedreigende gevolgen hebben. Neem in zo'n geval direct contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Restant tabletten
Houdt u tabletten over, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:

Polikliniek Reumatologie		
Locatie Venlo	routenummer 53	☎ (077) 320 59 32
Locatie Venray	routenummer 6	☎ (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎(077) 320 55 55

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl

© VieCuri Patiëntencommunicatie
7 juli 2021 bestelnummer plaquenil