

Reumatologie

Gebruik methotrexaat en de COVID-19 vaccinatie

In 2021 starten de COVID-19 vaccinaties. Het gebruik van methotrexaat kan een effect hebben op de werking van de vaccinatie. Dit geldt voor de vaccinaties voor het coronavirus en de griepvaccinaties (welbekende griepprik).

Keuzes

Er zijn 2 opties:

1. **Nadat u bent gevaccineerd stopt u 2 weken met het gebruiken van methotrexaat.** De periode van 2 weken gaat in op het moment dat u bent gevaccineerd. Op deze manier kan uw lichaam iets beter antistoffen aanmaken tegen het coronavirus (of griepvirus). Hiermee heeft u een optimaal effect van de vaccinatie. Wel heeft in de volgende maanden iets meer risico dat uw reumatische ziekte opvlamt. Dit komt doordat u 2 weken geen medicatie hiervoor heeft gebruikt.
2. **Nadat u bent gevaccineerd blijft u de methotrexaat gebruiken.** U neemt uw medicatie in zoals uw arts dit heeft voorgeschreven. Hierdoor heeft u kans dat de vaccinatie iets minder goed werkt. Wel heeft u minder risico dat uw reumatische ziekte opvlamt. Dit komt doordat u uw medicatie gewoon blijft innemen.

U kiest zelf welke optie voor u het beste is. Kijk hierbij goed naar de gevolgen van beide opties zodat u een goede keuze kunt maken. Maak een goede afweging tussen het risico om besmet te raken met het coronavirus en het risico dat uw reumatische ziekte opvlamt.

Heeft u nog vragen of wilt u deze keuze graag bespreken? Dan kunt u terecht bij uw behandelende arts, reumaconsulent of physician assistant.

Polikliniek Reumatologie		
Locatie Venlo	routenummer 53	☎ (077) 320 59 32
Locatie Venray	routenummer 6	☎ (0478) 52 22 86

Verpleegkundig reumaconsulent	
Locatie Venlo	☎ (077) 320 59 32
Locatie Venray	☎ (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
☎ (077) 320 55 55

Locatie Venray

Merseloseweg 130
5801 CE Venray
☎ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl