

# U gaat nu bij uzelf Fragmin® toedienen



1

Neem het injectiespuitje uit de strip.

Heeft uw injectiespuitje een needle-trap? Zie dan eerst de instructies achterop, onderaan deze kaart.



2

Pak het naald-afdekdopje vast en trek het in één beweging naar boven los.



3

Als er een druppel aan de naald blijft zitten, schud die er dan af.

De luchtbel in het spuitje kan geen kwaad, probeer deze NIET te verwijderen; de luchtbel zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt ingespoten.



4A

U kunt de vloeistof onder de huid spuiten zoals hier geïllustreerd, in de voor of zijkant van uw buik.

Pak een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger.

Breng de naald loodrecht en in-zijn-geheel in de huidplooi.

Het spuitje vasthouden met duim en middelvinger.



5A

Door het spuitje tussen duim en middelvinger te houden, kunt u met de wijsvinger de vloeistof langzaam inspuiten.

Blijf de huidplooi tijdens het inspuiten vasthouden, NIET opzuigen!


Nadat u de vloeistof hebt ingespoten, kunt u de naald verwijderen en de huidplooi loslaten, NIET nawrijven!



Aangeboden door Pfizer  
als service voor gebruikers  
van FRAGMIN®

[pfizer.nl/fragmin](http://pfizer.nl/fragmin)





4B

Als alternatief kunt u de vloeistof ook onder de huid van het bovenbeen spuiten.

Pak een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger.

Breng de naald loodrecht en in-zijn-geheel in de huidplooi.

Het spuitje vasthouden met duim en middelvinger.



5B

Door het spuitje tussen duim en middelvinger te houden, kunt u met de wijsvinger de vloeistof langzaam inspuiten.

Blijf de huidplooi tijdens het inspuiten vasthouden, NIET opzuigen!

Nadat u de vloeistof hebt ingespoten, kunt u de naald verwijderen en de huidplooi loslaten, NIET nawrijven!




6

Berg het gebruikte spuitje op in een naaldcontainer.


Na afloop kunt u de naaldcontainer terugbrengen bij de apotheek.

#### Let op dat u NIET spuit:

- Op littekenweefsel.
- Op plaatsen die ontstoken of pijnlijk zijn.
- In verlamde of geopereerde ledematen of ledematen met trombose of oedeem.
- Op plaatsen met rode verkleuringen.
- In de buurt van grote bloedvaten.
- Binnen een cirkel van 4 cm rond de navel.
- Binnen een omtrek van 2 cm van de vorige injectieplaats.



Wel needle-trap? Buig het 'needle-trap' veiligheidssysteem zo'n 60 - 80 graden



Buig het naaldje na de injectie vast in de 'needle-trap' door de naald tegen een harde stabiele ondergrond te drukken.

Gebruik NOOIT een vinger of hand om de needle-trap naar de naald te brengen!

**Dat is alles!** Hebt u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.